



“Una manera de hacer Europa”

Ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 - Proyectos de Investigación en Salud convocatoria 2020. Ayudas financiadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional			
REFERENCIA	TÍTULO	IMPORTE CONCEDIDO	RESUMEN
PI20/01334	Promoción de la toma de decisiones compartidas en cribado oportunista en cáncer de próstata.	50.215,00	En este estudio se plantea analizar el mejor diseño y estrategia de implementación de una ayuda en la toma de decisiones clínicas para la realización del cribado oportunista del cáncer de próstata, incorporando la colaboración de los principales actores implicados, los clínicos y los pacientes. Dada la controversia existente en la realización de este cribado, la incorporación de la decisión compartida entre médicos y pacientes cuando se solicita una determinación de PSA conducirá a pacientes bien informados quienes tomarán decisiones basadas en sus preferencias y de acuerdo a las recomendaciones establecidas por las principales sociedades científicas, limitando la posibilidad de resultados falsos positivos así como de sobrediagnóstico, mejorando su calidad de vida y su salud.
PI20/00557	PREDIMED+DM: Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención de diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico.	52.030,00	El estudio PREDIMED-PLUS es un estudio de intervención aleatorizado para evaluar la eficacia para perder peso y prevenir la Diabetes tipo 2 en personas con alto riesgo cardiometabólico, mediante una intervención intensiva con Dieta Mediterránea tradicional hipocalórica, actividad física y terapia conductual, en comparación con consejo de Dieta mediterránea, en un contexto médico habitual. En el estudio se analizan en toda España unos 6600 participantes en alto riesgo cardiometabólico durante un seguimiento de 6 años.